

2022 年全国职业院校技能大赛护理技能赛项

理论竞赛 试卷 2

（一）单项选择题。每题含A、B、C、D、E五个选项，选项中有一个正确答案，参赛选手应将的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分（本大题共80个小题，每小题1分，共80分）。

1. 病毒性心肌炎患者的治疗要点不包括（ ）
 - A. 预防心力衰竭
 - B. 抗生素治疗
 - C. 抗病毒治疗
 - D. 急性期卧床休息
 - E. 防治心律失常
2. 患者，男，50岁。患肝硬化入院。自诉“皮肤瘙痒，睡觉的时候会把皮肤挠破”。皮肤瘙痒的原因可能是（ ）
 - A. 叶酸缺乏
 - B. 凝血时间延长
 - C. 胆红素水平提高
 - D. 高钾血症
 - E. 低蛋白血症
- 3 癫痫持续状态的首选药物是（ ）
 - A. 地西泮
 - B. 三唑仑
 - C. 硫喷妥钠
 - D. 巴比妥类
 - E. 水合氯醛
- 4 患者，男，45岁。慢性肾衰竭尿毒症期。因酸中毒给予5%碳酸氢钠250ml静滴后出现手足抽搐，最可能的原因是发生了（ ）
 - A. 低血钾
 - B. 低血钙
 - C. 高钠血症
 - D. 碱中毒
 - E. 脑出血

(5-7题共用题干)

患者，女，25岁，因皮肤出现瘀点、瘀斑及月经过多就诊，门诊以“慢性特发性血小板减少性紫癜”收入院。

5. 导致其血小板减少的主要原因是（ ）

- A. 出血
- B. 脾脏肿大及功能亢进
- C. 病毒感染
- D. 雌激素抑制血小板生成
- E. 自身免疫反应

6. 其血小板计数一般在（ ）

- A. $<20 \times 10^9/L$
- B. $20-30 \times 10^9/L$
- C. $30-80 \times 10^9/L$
- D. $80-100 \times 10^9/L$
- E. $>100 \times 10^9/L$

7. 其治疗首选药物为（ ）

- A. 血小板悬液
- B. 糖皮质激素
- C. 止血药
- D. 环磷酰胺
- E. 雄激素

(8-9题共用题干)

患者，女，33岁。上腹痛已1天，能忍受，但今中午进食后疼痛剧烈，伴有呕吐，吐后疼痛不缓解，疑为急性胰腺炎。

8. 病情处理不当很可能会出现（ ）

- A. 感染
- B. 胰痿
- C. 大出血
- D. 出血坏死型胰腺炎
- E. MODS

9. 抑制胰腺分泌作用最强的药物是（ ）

- A. 阿托品
- B. 西咪替丁
- C. 生长抑素
- D. 环丙沙星
- E. 奥米拉唑

10. 患者，男，27岁。既往体健，体检时肝功能正常，抗-HBs阳性，HBV其他血清病毒标记物均为阴性。其很担心自己患上乙型肝炎，护士应告知患者其此时的状况是（ ）

- A. 乙型肝炎具有传染性
- B. 乙型肝炎但病情稳定
- C. 乙型肝炎病毒携带状态
- D. 处于乙型肝炎恢复期

E. 对乙型肝炎病毒具有免疫力

11. 患者，男，30岁，农民。患病毒性心肌炎经治疗康复后出院。出院医嘱要求患者出院后限制活动6个月。患者认为现无不适现象，询问为何不能下地干农活。护士向患者说明此时合理休息的主要原因是（ ）

- A. 减少疲劳感
- B. 减轻精神压力
- C. 减少心肌耗氧量
- D. 恢复体力，增强体质
- E. 增加战胜疾病的信心

12. 患者，男，58岁。糖尿病病史30余年。目前使用胰岛素治疗，但血糖未规律检测。近3个月出现眼睑及下肢浮肿来诊。尿常规检查：尿糖++，WBC 0-4/HP，尿蛋白+++。应优先考虑的是（ ）

- A. 胰岛素性水肿
- B. 肾动脉硬化
- C. 肾盂肾炎
- D. 急性肾炎
- E. 糖尿病肾病

13. 患者，女，35岁，突然出现大便为暗红色，遵医嘱做粪便隐血检查。暗红色便提示其有（ ）

- A. 下消化道出血
- B. 上消化道出血
- C. 胆道梗阻
- D. 痔疮
- E. 肠套叠

(14-15题共用题干)

患者，男，41岁，上腹痛伴反酸，暖气3个月，检查上腹轻压痛，大便隐血试验持续阳性，纤维胃镜检查后诊断为十二指肠球部溃疡。

14. 大便隐血试验持续阳性提示为（ ）

- A. 并发幽门梗阻
- B. 溃疡恶变
- C. 溃疡病变活动
- D. 并发慢性穿孔
- E. 合并胃炎

15. 符合十二指肠溃疡疼痛的典型节律是（ ）

- A. 进食-缓解-疼痛
- B. 疼痛-进食-缓解
- C. 缓解-疼痛-进食
- D. 进食-疼痛-缓解
- E. 疼痛-进食-疼痛

16. 下列药物中均为幽门螺杆菌治疗方案药物的是 ()

- A. 红霉素+奥美拉唑+阿莫西林+枸橼酸铋钾
- B. 奥美拉唑+克拉霉素+阿莫西林+枸橼酸铋钾
- C. 硫酸镁+奥美拉唑+克拉霉素+枸橼酸铋钾
- D. 多潘立酮+奥美拉唑+克拉霉素+枸橼酸铋钾
- E. 青霉素+克拉霉素+甲硝唑+枸橼酸铋钾

17. 狂犬病毒主要存在于病畜的 ()

- A. 肝脏中
- B. 肺脏及肝脏中
- C. 肾脏及肝脏中
- D. 肺脏及肾脏中
- E. 脑组织及脊髓中

18. 患者，男，60岁。肝硬化5年，少量腹水，口服利尿剂，近日为补充营养口服蛋白粉，今天家属发现其表情淡漠，回答问题准确，但吐字不清，有双手扑翼样震颤。其发病诱因是 ()

- A. 上消化道出血
- B. 高蛋白饮食
- C. 感染
- D. 大量排钾利尿
- E. 放腹水

19. 患者，男性，42岁，间歇性上腹痛3年，有嗝气、反酸、食欲缺乏，冬春季节较常发作。近3天来腹痛加剧，突然呕血200ml。该患者出血的原因，最有可能的是 ()

- A. 慢性胃炎
- B. 消化性溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃肠道黏膜糜烂
- E. 肝硬化

(20-21题共用题干)

患者，女性，35岁。胆石症病史5年。今晨突感上腹部疼痛，阵发性加剧，伴恶心、呕吐。自服止痛剂无效，急诊入院，怀疑急性胰腺炎。

20. 下列关于淀粉酶测定说法不正确的是 ()

- A. 血清淀粉酶一般在起病后6-12小时开始升高
- B. 尿淀粉酶一般在起病后12-14小时开始升高
- C. 淀粉酶高低与病情轻重成正比
- D. 尿淀粉酶受患者尿量的影响
- E. 出血坏死型胰腺炎血清淀粉酶值可正常或低于正常

21. 急性胰腺炎患者禁用吗啡止痛的主要原因是 ()

- A. 抑制呼吸中枢
- B. 易造成患者成瘾，产生依赖

- C. 损害肝肾功能
- D. 引起Oddi括约肌痉挛，加重病情
- E. 镇痛作用持久，掩盖病情

22. 患者，男，62岁。高血压10年。夜间睡眠中突然憋醒，大汗淋漓，被迫坐起。喘息，咳粉红色泡沫痰。双肺闻及广泛哮鸣音。给予乙醇湿化吸氧。采用乙醇湿化吸氧的目的是（ ）

- A. 湿化气道
- B. 净化气道
- C. 降低通气阻力
- D. 降低肺泡表面张力
- E. 降低肺泡内泡沫的表面张力

23. 患者，女，33岁，干咳伴乏力，低热、夜间盗汗、体重减轻2月余。X线胸片：右上肺阴影。疑诊肺结核收住入院，经检查确诊为肺结核，拟行异烟肼、利福平和吡嗪酰胺化疗。利福平的药物副作用是可引起（ ）

- A. 周围神经炎
- B. 听力障碍
- C. 球后视神经炎
- D. 胃肠道反应
- E. 肝损害

(24-25题共用题干)

患者，女，30岁。患系统性红斑狼疮住院。本次住院面部红斑明显，有少许鳞屑，尿常规阴性，肾功能正常，血抗核抗体阳性，抗双链DNA抗体阳性。

24. 治疗本病的主要药物是（ ）

- A. 布洛芬
- B. 乙酸水杨酸
- C. 糖皮质激素
- D. 免疫抑制剂
- E. 苯妥英钠

25. 对该患者实施的护理，下列哪项欠妥（ ）

- A. 限制钠盐摄入
- B. 安置背阳的病室，卧床休息
- C. 面部红斑用清水洗脸
- D. 忌食芹菜、香菜等含补骨脂素食物
- E. 紫外线消毒病室，每日2次

(26-27题共用题干)

患者，女性，21岁，腕、踝关节疼痛及脱发1年，今晨在海边游泳时发现面部出现紫红斑，遂就医。查体：头发稀疏，面颊及颈部均有不规则圆形红斑，口腔有溃疡。化验：血中查出狼疮细胞。

26. 脱发护理时，以下护理措施哪项不妥（ ）

- A. 温水洗发

- B. 每周洗发两次
- C. 洗发时，边洗边按摩
- D. 梅花针轻刺头皮
- E. 烫发可使毛发增生

27. 患者，男，70岁。高血压病史20年，糖尿病病史15年。平时血压控制在160-170/100-105mmHg之间。该患者的高血压危险度分层属于（ ）

- A. 无危险组
- B. 低度危险组
- C. 中度危险组
- D. 高度危险组
- E. 极高度危险组

28. 王先生，50岁。居住潮湿，数年前出现多个小关节肿胀疼痛，伴晨僵1年，10天前加重入院。诊断为类风湿关节炎。不属于本病诱因的是（ ）

- A. 寒冷
- B. 潮湿
- C. 疲劳
- D. 感染
- E. 进食寒凉食物

29. 患者，女，32岁。患溃疡性结肠炎3年，急性加重2周入院。入院后护士评估患者的粪便形态最可能发现的是（ ）

- A. 米泔水样便
- B. 柏油便
- C. 粘液脓血便
- D. 白陶土样便
- E. 黄色软便

30. 急性肺水肿患者吸氧宜采用的方法是（ ）

- A. 持续高流量吸氧
- B. 间断高流量吸氧
- C. 间断低流量吸氧
- D. 低流量乙醇湿化吸氧
- E. 高流量乙醇湿化吸氧

31. 患者，男，58岁。糖尿病住院，经过治疗血糖得以控制，病情稳定准备出院。护士给该患者进行出院饮食指导时，应告诉其每日总热量在三餐中的比例为（ ）

- A. 早餐1/6、剩下的午餐、晚餐各半
- B. 早餐1/5、中餐、晚餐各2/5
- C. 早餐1/4、剩下的中餐、晚餐各半
- D. 早餐1/4、中餐1/2、晚餐为1/4
- E. 早餐1/2、剩下的午餐、晚餐各半

32. 患者，男，28岁，酗酒后突发剧烈上腹绞痛10h伴呕吐、冷汗、面色苍白入院，

查体：T39.1℃，p110次/分，BP83/60mmHg。腹上区压痛及反跳痛阳性，腹肌紧张，Grey-Turner征阳性。实验室检查：血清淀粉酶升高，血钙降低，下面最可能的诊断是（ ）

- A. 急性水肿型胰腺炎
- B. 出血坏死型胰腺炎
- C. 急性胃穿孔
- D. 胃溃疡
- E. 胆石症

33. 心室颤动患者的脉搏特征是（ ）

- A. 快而规则
- B. 慢而规则
- C. 快而不规则
- D. 慢而不规则
- E. 摸不到

34. 患者，男，62岁。诊断“COPD，II型呼衰，肺性脑病”。护理人员应避免使用以下哪项处理措施（ ）

- A. 持续性低流量给氧
- B. 静脉滴注抗生素
- C. 肌注呋塞米
- D. 烦躁时使用镇静剂
- E. 口服解痉平喘类药物

35. 患者，男性，9岁。近1周前出现食欲不振、恶心、呕吐，活动减少，伴有发热，体温在37-38℃，近2天出现尿黄来医院就诊。出生时注射过乙型肝炎疫苗。检查：巩膜黄染，肝肋下1.5cm，脾未触及。化验ALT 980U/L，总胆红素16.5umol/L。患者应进行（ ）

- A. 呼吸道隔离
- B. 消化道隔离
- C. 接触隔离
- D. 血液隔离
- E. 分泌物隔离

36. 患者，女，75岁。左心衰竭5年。与家人争吵后心悸、气短、不能平卧、咳粉红色泡沫痰。体检：血压90/60mmHg，呼吸28次/分，神志清醒，端坐位，口唇发绀，两肺满布湿啰音及哮鸣音。患者吸氧宜采用的方法是（ ）

- A. 持续高流量吸氧
- B. 高流量乙醇湿化吸氧
- C. 间断低流量吸氧
- D. 低流量乙醇湿化吸氧
- E. 间断高流量吸氧

37. 呕吐大量宿食的是（ ）

- A. 胃溃疡
- B. 慢性胃炎
- C. 十二指肠溃疡
- D. 急性肝炎
- E. 幽门梗阻

38. 护理记录一般要求 I 级护理的患者 ()

- A. 每班记录 1 次
- B. 至少每天记录 1 次
- C. 至少 2 天记录 1 次
- D. 白天记录 1 次
- E. 至少 4 天记录 1 次

39. 可引起精神性呕吐的是 ()

- A. 颅内高压
- B. 癔症
- C. 脑震荡
- D. Meniere 病
- E. 有机磷杀虫剂中毒

40. 呕吐物多且有粪臭味的是 ()

- A. 幽门梗阻
- B. 小肠炎
- C. 小肠梗阻
- D. 胃潴留
- E. 有机磷杀虫剂中毒

41. 现病史不包括 ()

- A. 本次疾病的起病情况
- B. 主要症状的部位, 性质, 程度
- C. 病情的发展、演变情况
- D. 治疗情况
- E. 既往的健康状况

42. 便秘是指 7 天内排便次数少于 ()

- A. 2 次
- B. 4 次
- C. 6 次
- D. 8 次
- E. 10 次

43. 一般情况下，危重患者护理记录至少（ ）

- A. 每 2 小时记录 1 次
- B. 每 4 小时记录 1 次
- C. 每 6 小时记录 1 次
- D. 每 8 小时记录 1 次
- E. 每 10 小时记录 1 次

44. 有关问诊，正确的是（ ）

- A. “您感到哪里不舒服？”
- B. “您出现过黄疸吗？”
- C. “您头痛是否伴有呕吐？”
- D. “您是不是下午发热？”
- E. “您失眠吗？”

45. 系统性红斑狼疮患者敏感性最高的实验室检查是（ ）

- A. 红细胞增多
- B. 抗核抗体
- C. 抗 Sm 抗体
- D. 淋巴细胞增多
- E. 血小板减少

46. 患者，男，43岁。踢球时突感左臂及心前区剧痛，有濒死感，就地休息30分钟未缓解，伴烦躁不安、恶心、出冷汗，急送至急诊科。心电监护示多导联ST段弓背状抬高，T波倒置，可见异常深宽Q波。最可能发生了（ ）

- A. 稳定性心绞痛
- B. 急性心包炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 心脏神经官能症
- E. 急性主动脉夹层动脉瘤

47. 采集血气分析标本时，错误的操作是（ ）

- A. 使用2ml无菌干燥注射器
- B. 抽取经过稀释的肝素溶液，充盈注射器后弃去
- C. 无菌操作下抽取动脉血1ml
- D. 将血迅速注入无菌试管内并用软木塞塞住
- E. 立即送检

48. 患者，男，31岁。2月来出现午后低热，盗汗，乏力，消瘦，食欲不振，近一周高热，咳嗽，咳痰，痰中带血。痰结核分枝杆菌阳性。应用链霉素抗结核治疗。链霉素长期应用可出现的不良反应是（ ）

- A. 周围神经炎

- B. 肝损害
- C. 眩晕，听力障碍
- D. 高尿酸血症
- E. 视神经炎

49. 肝癌按组织细胞分型，最常见的类型是（ ）

- A. 混合型
- B. 胆管细胞型
- C. 肝细胞型
- D. 结节型
- E. 弥漫型

50. 患者，女，50岁。最近血压波动在160-170/90-95mmHg，诊断为高血压，属于（ ）

- A. 舒张期高血压
- B. 收缩期高血压
- C. 一级高血压
- D. 二级高血压
- E. 三级高血压

51. 属于甲类传染病的疾病是（ ）

- A. 传染性非典型肺炎
- B. 猩红热
- C. 肺结核
- D. 霍乱
- E. 伤寒

52. 频发早搏的心律失常患者，不可饮用浓茶的目的主要是避免（ ）

- A. 影响铁的摄入
- B. 过多液体的摄入
- C. 过多咖啡因的摄入
- D. 过多 K^+ 的摄入
- E. 过多 Ca^{2+} 的摄入

53. HIV感染后对免疫系统造成损害，主要的机理是损害哪类细胞（ ）

- A. 中性粒细胞
- B. 淋巴细胞
- C. CD_4^+ T淋巴细胞
- D. CD_8^+ T淋巴细胞
- E. 自然杀伤(NK)细胞

54. 患者，女，26岁。系统性红斑狼疮患者，用药治疗过程中出现胃溃疡发作，考虑与哪种药物的不良反应有关（ ）

- A. 环磷酰胺

- B. 羟氯喹
- C. 泼尼松
- D. 雷公藤总苷
- E. 免疫球蛋白

55. 某孕妇，25岁，平时身体健康，目前孕30周。昨晚平卧于床上看书时，感觉头晕、心悸、出汗。该孕妇出现的问题是（ ）

- A. 妊娠合并心脏病
- B. 妊娠合并高血压
- C. 妊娠期高血压疾病
- D. 仰卧位低血压综合征
- E. 妊娠合并肾炎

56. 中医理论中，“具有防御作用而运行于外之气”被称为（ ）

- A. 元气
- B. 营气
- C. 肺气
- D. 卫气
- E. 真气

57. 右心衰竭皮肤黏膜发绀的原因是（ ）

- A. 肺循环血液中还原血红蛋白减少
- B. 肺循环血液中还原血红蛋白增多
- C. 体循环血液中还原血红蛋白减少
- D. 体循环血液中还原血红蛋白增多
- E. 血液中铁血红蛋白减少

58. “我来介绍一下，这位是小赵，这位是小张，你们认识一下吧”，此种介绍方式属于（ ）

- A. 标准式
- B. 简介式
- C. 强调式
- D. 推荐式
- E. 社交式

59. 在组织结构的高层，管理幅度一般为（ ）

- A. 1~2 人
- B. 3~4 人
- C. 4~8 人
- D. 8~10 人
- E. 8~15 人

60. 提高护理管理水平和技术水平，最终目的是（ ）

- A. 为了提高护理质量
- B. 扩大医院的生存空间
- C. 提高医院的市场竞争力
- D. 提高护士的工作能力

E. 提高医院的护理水平

61. 制定护理质量标准时，要尽量用数据表达，对一些定性标准也尽量将其转化为可计量的指标。体现的原则是（ ）

- A. 科学性原则
- B. 可衡量性原则
- C. 先进性原则
- D. 实用性原则
- E. 相对稳定性原则

62-63共用题干

患者，女性，78岁。由于脑血栓导致左侧肢体偏瘫入院，病情稳定，医嘱二级护理。次日凌晨一时，患者坠床，造成颅内出血，虽经全力抢救，终因伤势过重死亡。

62. 造成该事件的主要原因是（ ）

- A. 病房环境过于昏暗
- B. 护士没有升起床档
- C. 护士没有进行健康教育
- D. 没有安排家属陪护
- E. 没有安排专人24小时照护

63. 根据对患者造成的伤害程度，该事故属于（ ）

- A. 医嘱差错
- B. 一级医疗事故
- C. 二级医疗事故
- D. 三级医疗事故
- E. 护理差错

64. 目前认为精神分裂症最重要的病因是（ ）

- A. 遗传因素
- B. 心理因素
- C. 环境因素
- D. 脑结构的改变
- E. 神经生化异常

65. 属于肠内营养禁忌证的是（ ）

- A. 胃部分切除患者
- B. 急性胰腺炎的急性期患者
- C. 肠广泛切除的患者
- D. 症状明显的糖尿病患者
- E. 肝功能衰竭患者

66. 目前，最常引起输血后肝炎的是（ ）

- A. HAV
- B. HBV
- C. HCV
- D. HDV
- E. HEV

67. 患者，男，65岁。因慢性肺源性心脏病合并肺炎、右心衰竭住院治疗。护士核对医嘱时，应提出质疑的是（ ）

- A. 一级护理
- B. 持续吸氧6L/min
- C. 头孢美唑钠2.0g+5%葡萄糖100ml, ivgtt, q12h
- D. 沐舒坦30mg+0.9%氯化钠100ml, ivgtt, tid
- E. 氢氯噻嗪25mg, po, bid

68. 呋塞米利尿的主要作用部位是 ()

- A. 远曲小管近端
- B. 远曲小管远端
- C. 肾小管髓袢升支粗段
- D. 集合管
- E. 近曲小管

69. 某急性心肌梗死的患者发病48小时后, 要求到厕所大便, 责任护士应该 ()

- A. 嘱家人陪同前往
- B. 用开塞露后, 再允许前往
- C. 先给予缓泻剂, 再允许前往
- D. 如无便秘史, 应允许前往
- E. 制止患者, 指导其床上使用便盆

70. 患者, 女, 60岁。因急性心肌梗死入院, 病情不稳定。该患者出现哪项心律失常时需高度警惕室颤的发生 ()

- A. 房室传导阻滞
- B. 窦性心动过缓
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤
- E. 室性心动过速

71. 下列不属于心脏传导系统的是 ()

- A 窦房结 B房室结
- C冠状窦 D希氏束
- E结间束

72. 下列具有自律性的心肌细胞为 ()

- A心房肌细胞
- B心室肌细胞
- C乳头肌细胞
- D心内膜细胞
- E窦房结

73. 正常情况下心室的除极方向是 ()

- A由心内膜到心外膜
- B由心外膜到心内膜

- C由心底到心尖
- D由心尖到心底
- E由左到右

74 主动脉瓣的解剖位置在 ()

- A左心室和主动脉之间
- B右心室和肺动脉之间
- C左心房和左心室之间
- D右心房和右心室之间
- E主动脉和肺动脉之间

75. 长期服用利尿剂（呋塞米）的心衰患者，护士应当最关注的不良反应是 ()

- A低血压
- B低血钾
- C低血钠
- D脱水
- E发热

76射血分数可反映心脏收缩功能，其正常值应是 ()

- A>30%
- B>35%
- C>40%
- D>45%
- E>50%

77 慢性心力衰竭患者吸氧流量为 ()

- A1~2L/min
- B2~4L/min
- C4~6L/min
- D6~8L/min
- E8~10L/min

78左心衰竭的最典型症状是 ()

- A咳嗽
- B咯血
- C劳力性呼吸困难
- D夜间阵发性呼吸困难
- E少尿

79急性左心衰竭肺水肿时，以下处置中错误的是 ()

- A酒精湿化氧气、高流量吸入
- B杜冷丁肌肉注射
- C西地兰缓慢静脉注射
- D地塞米松静脉注射

E让患者平卧位

80 左心衰竭肺淤血的护理诊断是（ ）

A气体交换受损

B活动无耐力

C组织灌注不良

D营养失调

E皮肤完整性受损

（二）多项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个以上包括五个）的答案是正确的，参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分（本大题共20个小题，每小题2分，共40分）。

1 护理程序的步骤包括（ ）

A. 评估 B. 诊断 C. 计划 D. 实施 E. 评价

2 护理体检包括（ ）

A视诊 B 触诊 C叩诊 D听诊 E嗅诊

3 以下关于叩诊音描述哪些正确（ ）

A正常肺部叩诊音为清音

B肺气肿为过清音

C大叶性肺炎为浊音

D肝硬化腹水为鼓音

E胸腔积液为实音

4 以下关于临床表现描述哪些正确（ ）

A支扩为厌氧菌感染，痰液呈恶臭味

B肺脓肿为厌氧菌感染，痰液呈恶臭味

C大咯血患者痰液呈血腥味

D有机磷中毒呼吸为大蒜味

E糖尿病酮症酸中毒呈烂苹果味

5 以下关于临床表现描述哪些正确（ ）

A尿毒症患者呼吸呈氨臭味

B 肝性脑病患者呼吸呈肝腥味

C 幽门梗阻呕吐物为碱味

D 低位性肠梗阻呕吐物为粪臭味

E 膀胱炎患者尿液呈氨臭味

6 马斯洛的需要层次论正确的是（ ）

A 食物和水的需要属于生理需要

B 睡眠属于安全需要

- C 健康保障属于安全需要
- D 自我尊重属于尊重需要
- E 被他人尊重属于尊重需要

7 职业损伤的危险因素包括（ ）

- A生物性因素 B化学性因素 C物理性因素 D心理因素 E社会因素

8 关于锐器伤的防护措施错误的是（ ）

- A严格按照规程操作，防止被各种针具、刀片、破裂安瓿等医用锐器刺伤或划伤。
- B使用安瓿制剂时，先用砂轮划痕再掰安瓿，并垫棉球或纱布以防损伤皮肤。
- C 抽吸药液时严格使用无菌针头，抽吸后立即双手操作套上针帽。
- D 制定完善的手术器械如刀、剪、针等摆放及传递的规定，规范器械护士的基本操作。
- E手持针头或锐器时请将针尖或锐器小心面对他人，以免刺伤他人。

9 关于锐器伤的防护措施正确的是（ ）

- A 禁止用手直接接触使用后的针头、刀片等锐器。
- B 禁止将使用后的针头重新套上针帽（除外某项操作，如抽动脉血进行血气分析）。
- C 严格执行医疗废物分类标准。
- D 锐器盒要有明显标志。
- E 加强护士职业安全教育与健康管理。

10 锐器伤伤口处理正确的是（ ）

- A 挤：近心端向远心端；禁止伤口局部按压
- B 洗：肥皂水、流动水冲洗皮肤，等渗盐水冲洗黏膜
- C 消毒：75%乙醇、0.5%碘伏消毒，包扎
- D 报告 E登记

11 急诊的预检分诊正确的是（ ）

- A一问、二看、三检查、四分诊。
- B 遇到危重病人应立即通知值班医生
- C 遇到危重病人应立即通知抢救室护士
- D 遇到有法律纠纷、交通事故、刑事案件等应立即通知医院的保卫部门或公安部门，并请家属或陪送者留下
- E 遇有灾害性事件应立即通知护士长和有关科室

12 关于抢救物品准备正确的是（ ）

- A定数量品种 B 定点放置 C 定人保管 D定期使用
- E定期消毒灭菌和定期检查维修

13 医护人员“四轻”为（ ）

- A说话轻 B走路轻 C操作轻 D关门轻 E拿用物轻

14 需要特级护理的患者是 ()

A严重创伤 B复杂疑难的大手术后 C器官移植 D大面积烧伤 E休克

15 关于分级护理正确的是 ()

A 特级护理适合患者病情危重，需随时观察，以便进行抢救
B 昏迷患者需要一级护理
C 肝肾衰竭患者需要一级护理
D 慢性疾病患者适宜二级护理
E 基本自理的患者适宜三级护理

16 关于分级护理正确的是 ()

A 特级护理专人24小时护理
B 一级护理每1h巡视1次
C 一级护理红色标记
D 二级护理每2h巡视1次
E 三级护理每5小时巡视1次

17 关于漱口溶液正确的是 ()

A清洁口腔，预防感染用0.9%氯化钠溶液
B真菌感染用1%~4%碳酸氢钠溶液
C铜绿假单胞菌感染用0.1%醋酸溶液
D厌氧菌感染用甲硝唑溶液
E抗菌、防臭、口腔有溃烂坏死者用1%~3%过氧化氢溶液

18 关于压疮好发部位正确的是 ()

A 仰卧位：骶尾部
B 侧卧位：髋部
C 俯卧位：髂前上棘
D 坐位：坐骨结节
E 坐位：肩胛部

19 以下哪些表现属于压疮炎性浸润期 ()

A皮肤转为紫红
B皮下产生硬结 C 表皮出现水疱
D水疱极易破溃，显露出潮湿红润的创面 E疼痛

20 人体散热方式包括 ()

A辐射 B对流 C蒸发 D接触 E传导